

LO QUE DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON KORLYM



Angela tomó Korlym y vive con el síndrome de Cushing endógeno

A medida que comiences a tomar **Korlym**, mantenerte informado puede ayudarte a manejar tu atención médica. Esta guía ofrece **una descripción general de Korlym, lo que se puede esperar durante el tratamiento y qué apoyo hay disponible para ti.**

Nota: Algunos enlaces que se encuentran en este documento solo están disponibles en inglés

INDICACIÓN

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado.

Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing.

Se desconoce si **Korlym** es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Korlym?

Korlym puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Pérdida del embarazo.** Si es mujer y puede quedar embarazada, usted debe:
 - tener un resultado negativo en la prueba de embarazo antes de empezar a tomar **Korlym** o antes de reiniciar el tratamiento con **Korlym** si deja de tomarlo durante más de 14 días
 - usar un método anticonceptivo no hormonal mientras toma **Korlym** y durante un mes después de dejar de tomar **Korlym**. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo. Informe de inmediato a su médico si cree que puede estar embarazada

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

¿QUÉ ES KORLYM?



Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre causado por el síndrome de Cushing endógeno. Funciona reduciendo ciertos efectos negativos del exceso de la actividad del cortisol en el cuerpo.

Antes de comenzar el tratamiento con Korlym, habla con tu profesional de atención médica sobre cualquier otra afección médica que puedas tener. Informa a todo tu equipo de profesionales de atención médica de que comenzarás el tratamiento con Korlym.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

No tome Korlym si:

- está embarazada
- está tomando medicamentos que contienen simvastatina, lovastatina, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, pimozida, quinidina, sirólimus o tacrólimus
- debe tomar medicamentos corticoesteroides para otros problemas médicos graves
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las células que recubren su útero (hiperplasia endometrial) o cáncer del recubrimiento de su útero (cáncer endometrial)
- tiene alergia a la mifepristona o a cualquiera de los ingredientes de **Korlym**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

EL CORTISOL Y EL SÍNDROME DE CUSHING

El síndrome de Cushing (hipercortisolismo)

se produce cuando un crecimiento en la glándula pituitaria, las glándulas suprarrenales o cualquier otra parte del cuerpo causa demasiada producción de cortisol. El cortisol es una hormona natural que el cuerpo produce para regular varias funciones, como la presión arterial, el azúcar en la sangre y los ciclos de sueño.

Con el tiempo, el exceso de cortisol puede provocar varios problemas de salud, como:

- Nivel alto de azúcar en la sangre
- Infecciones recurrentes o inusuales
- Aumento de peso
- Enfermedad cardiovascular
- Hipertensión



Aprende más sobre el hipercortisolismo en [Korlym.com](https://www.korlym.com).

Desde que comencé a tomar **Korlym**, **ha mejorado el nivel de azúcar en mi sangre**, también mi ánimo y comencé a perder peso.*



Escucha a otras personas que viven con síndrome de Cushing endógeno

Angela tomó **Korlym** y vive con síndrome de Cushing endógeno

* En el estudio clínico, algunos pacientes que recibieron **Korlym** reportaron cambios en su peso, la medida de la cintura, la apariencia (como la desaparición del acné), el estado de ánimo, los síntomas de depresión, la capacidad de pensar claramente y la fuerza muscular. No se sabe con certeza si **Korlym** causó estos cambios. Al inicio del estudio, los pacientes tenían un peso promedio de 220 libras y una talla de cintura promedio de 47 pulgadas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir:

- **reducción de los efectos de las hormonas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal)**. Informe de inmediato a su médico si presenta cansancio o debilidad inusuales, náuseas, fatiga, presión arterial baja (hipotensión), nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

CÓMO PUEDE AYUDAR KORLYM

En un estudio clínico **Korlym** se investigó durante 24 semanas en 50 adultos con síndrome de Cushing endógeno que no podían someterse a cirugía o para quienes la cirugía había fallado. Todos los pacientes recibieron **Korlym**. El efecto de **Korlym** sobre el nivel de azúcar en la sangre se probó en 29 pacientes con diabetes tipo 2 o con deterioro del control del azúcar en la sangre.*

En pacientes con diabetes tipo 2 o deterioro del control del azúcar en la sangre:



El 60 % (15 de 25) de los pacientes vieron al menos una mejoría del 25 % en los niveles de azúcar en su sangre. Algunos pacientes vieron una mejoría en el nivel de azúcar en su sangre dentro de las 6 semanas posteriores al inicio del tratamiento con **Korlym**



Al 47 % (7 de 15) de los pacientes que tomaban medicamentos antidiabéticos se les redujo la medicación

En todo el grupo de estudio:



Los pacientes reportaron una disminución general de los síntomas de depresión[†]



Los pacientes perdieron un promedio del 5.7 % de su peso corporal después de 6 meses. En promedio, los hombres (14 pacientes) perdieron 3.3 pulgadas y las mujeres (32 pacientes) perdieron 2.7 pulgadas de la talla de su cintura[†]

* También se evaluó a los pacientes en 8 categorías generales: control glucémico, lípidos, presión arterial, composición corporal, apariencia clínica, fuerza, síntomas psiquiátricos y calidad de vida.

[†] En el estudio clínico, algunos pacientes que recibieron **Korlym** reportaron cambios en su peso, la medida de la cintura, la apariencia (como la desaparición del acné), el estado de ánimo, los síntomas de depresión, la capacidad de pensar claramente y la fuerza muscular. No se sabe con certeza si **Korlym** causó estos cambios. Al inicio del estudio, los pacientes tenían un peso promedio de 220 libras y una talla de cintura promedio de 47 pulgadas.

Descarga la Agenda de Seguimiento de la página de recursos y utilízala para tomar nota de cómo te sientes con Korlym. Comparte los datos con tu profesional de atención médica para conversar sobre tu progreso y tus objetivos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir: (continuación)

- **bajo nivel de potasio en sangre (hipocalemia).** Su médico debe revisar el nivel de potasio en su sangre antes de que usted empiece a tomar **Korlym** y mientras lo toma. Informe a su médico si tiene debilidad muscular, dolores o calambres, latidos anormales o irregulares del corazón (palpitaciones)

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

CÓMO FUNCIONA KORLYM

Al competir con el cortisol a nivel celular, Korlym reduce ciertos efectos negativos del exceso de cortisol en el cuerpo.

Receptores de cortisol

Receptores de cortisol

Receptores de cortisol

Las células de todo el cuerpo tienen receptores de cortisol.

Korlym

Korlym

Korlym se adhiere a algunos receptores para que el exceso de cortisol no pueda hacerlo. Esto reduce la actividad del cortisol y puede ayudar a mejorar ciertos problemas de salud, como el nivel alto de azúcar en la sangre.

Cortisol

Korlym no reduce los niveles de cortisol ni impide que el cuerpo produzca cortisol. Es posible que aún tengas niveles altos de cortisol durante todo el tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir: (continuación)

- **sangrado vaginal.** Korlym puede hacer que el revestimiento de su útero se engrose y que su útero sangre. Informe de inmediato a su médico sobre cualquier sangrado vaginal que no sea normal para usted
- **alteraciones en el ciclo menstrual**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym[®]
mifepristone
300 mg Tablets

QUÉ SE PUEDE ESPERAR MIENTRAS TOMAS KORLYM

Si tu cuerpo ha estado expuesto a una alta actividad de cortisol a lo largo del tiempo, es posible que se haya acostumbrado a ella. Como resultado, **puede tomar tiempo adaptarse a una menor actividad de cortisol después de comenzar el tratamiento con Korlym. Durante este período, es posible que experimentes algo conocido como “abstinencia de cortisol”**. Es posible que te sientas peor antes de empezar a sentirte mejor y que a veces experimentes síntomas similares a los de la gripe. Algunos síntomas de la abstinencia de cortisol pueden incluir:


Fatiga
(sentirse muy cansado/a)

Dolores o debilidad en los músculos o las articulaciones

Náuseas

Dolor abdominal

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**.



Conoce lo que puedes esperar al iniciar el tratamiento con Korlym.

[Mira nuestro video](#)



Si experimentas alguno de estos síntomas, habla con tu profesional de atención médica, quien puede ayudarte a determinar si tus síntomas son causados por la abstinencia de cortisol o por una afección subyacente. Estos síntomas pueden mejorar a medida que alcances la dosis adecuada de **Korlym** para tu cuerpo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir: (continuación)

- problemas con el sistema eléctrico del corazón (prolongación del intervalo QT)
- empeoramiento de los síntomas de otros problemas médicos que se tratan con corticoesteroides cuando toma corticoesteroides y Korlym al mismo tiempo

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE KORLYM

Conocer los posibles efectos secundarios de **Korlym** puede ayudarte a detectarlos a tiempo. **Los efectos secundarios más comunes de Korlym incluyen:**

- Náuseas
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Bajo nivel de potasio en sangre
- Dolor en brazos y piernas (artralgia)
- Vómitos
- Hinchazón de brazos y piernas (edema periférico)
- Presión arterial alta
- Mareos
- Disminución del apetito
- Engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial)

Evita beber jugo de toronja (pomelo) mientras tomas **Korlym**, ya que puede aumentar la posibilidad de que se presenten efectos secundarios.

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir:

- Reducción de los efectos de las hormonas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal), que puede causar debilidad, náuseas, fatiga, presión arterial baja, nivel bajo de azúcar en la sangre
- Bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia), que puede causar debilidad muscular, dolores o calambres, latidos anormales o irregulares del corazón (palpitaciones)
- Sangrado vaginal inusual o alteraciones en el ciclo menstrual
- Cambios en el ritmo del corazón (prolongación del intervalo QT)
- Empeoramiento de los síntomas de las afecciones que se tratan con corticoesteroides cuando se toman al mismo tiempo que **Korlym**



Habla con tu profesional de atención médica sobre cualquier efecto secundario que tengas mientras tomas **Korlym**.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym? (continuación)

Los efectos secundarios más comunes de Korlym incluyen náuseas, fatiga, dolor de cabeza, bajo nivel de potasio en sangre, dolor en brazos y piernas (artralgia), vómitos, hinchazón de brazos y piernas (edema periférico), presión arterial alta, mareos, disminución del apetito, y engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico. Le recomendamos reportar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

CÓMO ENCONTRAR LA DOSIS ADECUADA PARA TI

Debes tomar **Korlym** una vez al día, con una comida y tragar la tableta entera. **Korlym** no debe partirse, masticarse ni triturarse.

El tratamiento comienza con una tableta de 300 mg al día.

300
MG/DÍA



1 tableta

600
MG/DÍA



2 tabletas

900
MG/DÍA



3 tabletas

1200
MG/DÍA



4 tabletas
Dosis máxima

Con el tiempo, tu profesional de atención médica puede aumentar lentamente tu dosis 1 tableta a la vez hasta un máximo de 4 tabletas o 1200 mg diarios. Esto dependerá de cómo responda tu cuerpo al tratamiento y de cuánto mejoren tus síntomas. Es probable que tu dosis no cambie con más frecuencia que cada 2 a 4 semanas.

Adaptándote a tu dosis

- A medida que tu cuerpo se adapta a **Korlym**, es posible que tu profesional de atención médica deba cambiar algunos de tus otros medicamentos, específicamente aquellos para el azúcar en la sangre
- En personas con función renal reducida o con problemas hepáticos de leves a moderados, la dosis máxima de **Korlym** debe limitarse a 600 mg/día. Habla con tu profesional de atención médica si tienes antecedentes de problemas renales o hepáticos
- Tu profesional de atención médica debe monitorear tus niveles de potasio antes y después de cada aumento de la dosis, y periódicamente durante todo tu tratamiento. Un aumento en la dosis también requerirá una nueva receta de tu profesional de atención médica

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Antes de tomar Korlym, informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada, si tiene bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia), si tiene o ha tenido un problema de hemorragia o si está tomando medicamentos para diluir la sangre, si tiene o ha tenido problemas cardíacos, si se ha sometido a un trasplante de órganos, si ha estado tomando medicamentos llamados corticoesteroides (cortisona, dexametasona, metilprednisolona, prednisolona, prednisona), si está amamantando o planea amamantar.

No debe beber jugo de toronja (pomelo) mientras toma **Korlym**.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

SEGUIMIENTO CONTINUO MIENTRAS TOMAS **KORLYM**

Antes de comenzar a tomar **Korlym** y durante todo el tratamiento, tú y tu profesional de atención médica harán un seguimiento de forma rutinaria de lo siguiente:



Azúcar en la sangre



Presión arterial



Niveles de potasio

Monitoreo del azúcar en la sangre y la presión arterial

También puede haber cambios en el azúcar en la sangre y en la presión arterial mientras tomas **Korlym**. Si no estás monitoreando esto en tu casa, pregúntale a tu profesional de atención médica si deberías empezar a hacerlo. **Korlym** puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre causada por el exceso de cortisol, por lo que, si tomas medicamentos para la diabetes, quizás haya que reducir o modificar la dosis.

Monitoreo de los niveles de potasio

Mientras tomes **Korlym**, deberán extraerte sangre de forma periódica para revisar los niveles de potasio. Esto es importante, ya que algunas personas pueden tener niveles de potasio más bajos de lo normal mientras están tomando **Korlym**. Los niveles bajos de potasio pueden causar riesgos graves para la salud. Si no se tratan, los niveles bajos de potasio pueden ocasionar presión arterial alta y afectar tu frecuencia cardíaca. Es posible que tu profesional de atención médica te recete potasio u otros medicamentos para que los niveles de potasio se mantengan normales.

Se deben revisar los niveles de potasio:

Antes de comenzar el tratamiento

De 1 a 2 semanas después de la primera dosis

De 1 a 2 semanas después de un aumento de dosis

Periódicamente a lo largo del tratamiento



Los síntomas de niveles bajos de potasio pueden incluir:

- Debilidad muscular, dolores o calambres
- Estreñimiento
- Latidos cardíacos anormales o irregulares (palpitaciones)
- Hinchazón de las manos o los pies (edema)

Aprende más sobre el monitoreo de rutina durante el tratamiento con Korlym.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de **Korlym** con ciertos medicamentos puede provocar que se afecten entre sí o causar efectos secundarios graves.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre **Korlym**.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

APOYO PERSONALIZADO DURANTE TODO EL TRATAMIENTO

Ya sea que necesites ayuda para comprender tu cobertura de seguro, explorar opciones de apoyo financiero o encontrar respuestas y recursos educativos, nuestro equipo de expertos está aquí para ayudarte en cada paso del camino.



Coordinadores de acceso para el paciente (CAP)

- Los **CAP** pueden ayudarte a verificar tus beneficios de seguro, asistir con el proceso de autorización previa y explicarte las opciones de asequibilidad. Una vez que esto se haya completado, tu CAP ayuda a coordinar con una farmacia especializada dentro de la red para entregar los medicamentos directamente en tu puerta.
- El equipo puede ayudarte a explorar opciones de asistencia financiera, como:
 - **Programa de Asistencia para Copagos:** reduce los costos de bolsillo de los pacientes elegibles
 - **Terapia de transición:** acceso temporal a medicamentos sin costo para pacientes elegibles durante interrupciones temporales de cobertura
 - **Terapia inicial:** asistencia con medicamentos por un máximo de 60 días mientras se verifica la cobertura del seguro para los pacientes que reúnen los requisitos
 - **Programa de Asistencia al Paciente (PAP):** medicamentos gratuitos para pacientes que reúnen los requisitos



Comunícate con un **Coordinador de Acceso para el Paciente** al **1-855-4KORLYM (1-855-456-7596)**



Promotores del Paciente Corcept Cares

- Los **Promotores del Paciente** especializados brindan apoyo personalizado y ofrecen educación y recursos cuando los necesites.
- Los Promotores del Paciente pueden brindarte apoyo al:
 - Explicar cómo funciona **Korlym** y qué se puede esperar durante el tratamiento
 - Brindar educación y recursos
 - Conversar sobre la importancia de hacer un seguimiento de tu progreso
 - Escuchar y brindar apoyo emocional

*Aunque los **Promotores del Paciente** brindan apoyo personalizado, no pueden ofrecer consejo médico. Habla regularmente con tu profesional de atención médica sobre tu tratamiento y cualquier efecto secundario que puedas experimentar.*



Regístrate para comunicarte con un Promotor del Paciente o llama al 1-855-295-9969

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

INDICACIÓN

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado.

Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing. Se desconoce si **Korlym** es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Korlym?

Korlym puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Pérdida del embarazo.** Si es mujer y puede quedar embarazada, usted debe:
 - tener un resultado negativo en la prueba de embarazo antes de empezar a tomar **Korlym** o antes de reiniciar el tratamiento con **Korlym** si deja de tomarlo durante más de 14 días
 - usar un método anticonceptivo no hormonal mientras toma **Korlym** y durante un mes después de dejar de tomar **Korlym**. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo. Informe de inmediato a su médico si cree que puede estar embarazada

No tome Korlym si:

- está embarazada
- está tomando medicamentos que contienen simvastatina, lovastatina, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, pimozida, quinidina, sirilimus o tacrólimus
- debe tomar medicamentos corticoesteroides para otros problemas médicos graves
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las células que recubren su útero (hiperplasia endometrial) o cáncer del recubrimiento de su útero (cáncer endometrial)
- tiene alergia a la mifepristona o a cualquiera de los ingredientes de **Korlym**

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir:

- **reducción de los efectos de las hormonas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal).** Informe de inmediato a su médico si presenta cansancio o debilidad inusuales, náuseas, fatiga, presión arterial baja (hipotensión), nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)
- **bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia).** Su médico debe revisar el nivel de potasio en su sangre antes de que usted empiece a tomar **Korlym** y mientras lo toma. Informe a su médico si tiene debilidad muscular, dolores o calambres, latidos anormales o irregulares del corazón (palpitaciones)

- **sangrado vaginal.** **Korlym** puede hacer que el revestimiento de su útero se engrose y que su útero sangre. Informe de inmediato a su médico sobre cualquier sangrado vaginal que no sea normal para usted
- **alteraciones en el ciclo menstrual**
- **problemas con el sistema eléctrico del corazón (prolongación del intervalo QT)**
- **empeoramiento de los síntomas de otros problemas médicos que se tratan con corticoesteroides cuando toma corticoesteroides y Korlym al mismo tiempo**

Los efectos secundarios más comunes de Korlym

incluyen náuseas, fatiga, dolor de cabeza, bajo nivel de potasio en sangre, dolor en brazos y piernas (artralgia), vómitos, hinchazón de brazos y piernas (edema periférico), presión arterial alta, mareos, disminución del apetito, y engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico. Le recomendamos reportar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Antes de tomar Korlym, informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada, si tiene bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia), si tiene o ha tenido un problema de hemorragia o si está tomando medicamentos para diluir la sangre, si tiene o ha tenido problemas cardíacos, si se ha sometido a un trasplante de órganos, si ha estado tomando medicamentos llamados corticoesteroides (cortisona, dexametasona, metilprednisolona, prednisolona, prednisona), si está amamantando o planea amamantar.

No debe beber jugo de toronja (pomelo) mientras toma **Korlym**.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de **Korlym** con ciertos medicamentos puede provocar que se afecten entre sí o causar efectos secundarios graves.

Consulte la [Información Importante](#) sobre **Korlym**, con una advertencia importante.

Korlym® es una marca registrada y Corcept Cares™ es una marca de Corcept Therapeutics Incorporated.

©2026 Corcept Therapeutics Incorporated. Todos los derechos reservados. US-KOR-26-0107 05-26