

INFORMACIÓN DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE KORLYM

Korlym puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Pérdida del embarazo.** Si es mujer y puede quedar embarazada, usted debe:
 - tener un resultado negativo en la prueba de embarazo antes de empezar a tomar **Korlym** o antes de reiniciar el tratamiento con **Korlym** si deja de tomarlo durante más de 14 días
 - usar un método anticonceptivo no hormonal mientras toma **Korlym** y durante un mes después de dejar de tomar **Korlym**. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo. Informe de inmediato a su médico si cree que puede estar embarazada

ACERCA DE KORLYM

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado.

Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing.

Se desconoce si **Korlym** es seguro y eficaz en niños.

NO tome Korlym si:

- está embarazada
- está tomando medicamentos que contienen simvastatina, lovastatina, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, pimozida, quinidina, sirólimus o tacrólimus
- debe tomar medicamentos corticoesteroides para otros problemas médicos graves
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las células que recubren su útero (hiperplasia endometrial) o cáncer del recubrimiento de su útero (cáncer endometrial)
- tiene alergia a la mifepristona o a cualquiera de los ingredientes de **Korlym**

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- si está embarazada o planea quedar embarazada
- si tiene bajo nivel de potasio en sangre (hipocalemia)
- si tiene o ha tenido un problema de hemorragia o si está tomando medicamentos para diluir la sangre
- si tiene o ha tenido problemas cardíacos
- si se ha sometido a un trasplante de órganos
- si ha estado tomando medicamentos llamados corticoesteroides (cortisona, dexametasona, metilprednisolona, prednisolona, prednisona)
- si está amamantando o planea amamantar

No debe beber jugo de toronja (pomelo) mientras toma **Korlym**.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de **Korlym** con ciertos medicamentos puede provocar que se afecten entre sí o causar efectos secundarios graves.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE KORLYM

Korlym podría causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- **reducción de los efectos de las hormonas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal).** Informe de inmediato a su médico si presenta cansancio o debilidad inusuales, náuseas, fatiga, presión arterial baja (hipotensión), nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)
- **bajo nivel de potasio en sangre (hipocalemia).** Su médico debe revisar el nivel de potasio en su sangre antes de que usted empiece a tomar **Korlym** y mientras lo toma. Informe a su médico si tiene debilidad muscular, dolores o calambres, latidos anormales o irregulares del corazón (palpitaciones)
- **sangrado vaginal.** **Korlym** puede hacer que el revestimiento de su útero se engrose y que su útero sangre. Informe de inmediato a su médico sobre cualquier sangrado vaginal que no sea normal para usted
- **alteraciones en el ciclo menstrual**
- **problemas con el sistema eléctrico del corazón (prolongación del intervalo QT)**
- **empeoramiento de los síntomas de otros problemas médicos que se tratan con corticoesteroides cuando toma corticoesteroides y Korlym al mismo tiempo**

Los efectos secundarios más frecuentes de Korlym incluyen los siguientes:

- | | |
|---|---|
| • náuseas | • hinchazón de brazos y piernas (edema periférico) |
| • fatiga | • presión arterial alta |
| • dolor de cabeza | • mareos |
| • bajo nivel de potasio en sangre | • disminución del apetito |
| • dolor en brazos y piernas (artralgia) | • engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial) |
| • vómitos | |

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico.

CÓMO TOMAR KORLYM

- **Korlym** se toma 1 vez al día de forma oral, con alimentos
- Trague la pastilla de **Korlym** entera. No parta, triture ni mastique las tabletas de **Korlym**

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Esto es solo un breve resumen de la información importante sobre **Korlym**. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información
- Descubra más sobre **Korlym** y la asistencia disponible en [Korlym.com](https://www.korlym.com)