



Cómo hablar de Korlym

con tu equipo de profesionales de atención médica

Guía de conversación para pacientes que toman Korlym® (mifepristona) en tabletas de 300 mg

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

Nota: Algunos enlaces que se encuentran en este documento solo están disponibles en inglés.

INDICACIÓN

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado.

Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing.

Se desconoce si **Korlym** es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Korlym?

Korlym puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Pérdida del embarazo.** Si es mujer y puede quedar embarazada, usted debe:
 - tener un resultado negativo en la prueba de embarazo antes de empezar a tomar **Korlym** o antes de reiniciar el tratamiento con **Korlym** si deja de tomarlo durante más de 14 días
 - usar un método anticonceptivo no hormonal mientras toma **Korlym** y durante un mes después de dejar de tomar **Korlym**. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo. Informe de inmediato a su médico si cree que puede estar embarazada

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Habr  ocasiones **en las que consultes a profesionales de atenci n m dica distintos del que te prescribe Korlym.**

Es importante que todo tu equipo de profesionales de atenci n m dica sepa que tomas **Korlym** y c mo puede afectar tu cuidado.

Esta gu a puede ayudarte a hablar con tu equipo de profesionales de atenci n m dica sobre **Korlym** y por qu  te lo recetaron. Tambi n puede ayudarte a dirigirlos a otros recursos para que puedan aprender m s.



INFORMACI N IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACI N)

No tome Korlym si:

- est  embarazada
- est  tomando medicamentos que contienen simvastatina, lovastatina, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, pimizida, quinidina, sir limus o tacr limus
- debe tomar medicamentos corticoesteroides para otros problemas m dicos graves
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las c lulas que recubren su  tero (hiperplasia endometrial) o c ncer del recubrimiento de su  tero (c ncer endometrial)
- tiene alergia a la mifepristona o a cualquiera de los ingredientes de **Korlym**

Consulte la Informaci n Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Informaci n Importante sobre Korlym](#).

Acerca de Korlym

PUNTOS CLAVE que debo informar a mi equipo de profesionales de atención médica



Tengo hipercortisolismo endógeno, también llamado síndrome de Cushing



Me recetaron **Korlym** para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre causado por el hipercortisolismo endógeno



Korlym funciona reduciendo determinados efectos negativos del exceso de actividad del cortisol



Korlym no reduce los niveles de cortisol

Mis signos y síntomas de hipercortisolismo endógeno pueden incluir:

- Aumento de peso
- Nivel alto de azúcar en la sangre o diabetes
- Presión sanguínea alta
- Estado de ánimo depresivo
- Nivel bajo de energía
- Cara redondeada
- Problemas de memoria y para pensar con claridad

Tu equipo de profesionales de atención médica puede obtener más información en Korlym.com/hcp.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir:

- **reducción de los efectos de las hormonas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal)**. Informe de inmediato a su médico si presenta cansancio o debilidad inusuales, náuseas, fatiga, presión arterial baja (hipotensión), nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym
mifepristone
300 mg Tablets

Cómo recetar Korlym

PUNTOS CLAVE que debo informar a mi equipo de profesionales de atención médica



Korlym y mis otros medicamentos recetados pueden afectarse entre sí



Korlym solo está disponible a través de farmacias especializadas, que enviarán la receta directamente a mi hogar. **Korlym** no está disponible en farmacias minoristas locales



Si se realiza algún cambio en mis medicamentos, será necesario llamar o enviar por fax mi lista de medicamentos al farmacéutico especializado para asegurarse de que **Korlym** se pueda usar de manera segura con mis otros medicamentos

El equipo de farmacéuticos especializados está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar apoyo.

Comunícate con la farmacia especializada
Teléfono: 1-855-4KORLYM (1-855-456-7596)
Fax: 1-855-288-0601

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir: (continuación)

- **bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia).** Su médico debe revisar el nivel de potasio en su sangre antes de que usted empiece a tomar **Korlym** y mientras lo toma. Informe a su médico si tiene debilidad muscular, dolores o calambres, latidos anormales o irregulares del corazón (palpitaciones)

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante sobre Korlym](#).

Korlym
mifepristone
300 mg Tablets

Cómo me puede afectar Korlym

PUNTOS CLAVE que debo informar a mi equipo de profesionales de atención médica



Mientras esté tomando **Korlym**, se deben controlar mis niveles de potasio, azúcar en la sangre y presión arterial



A medida que continúo el tratamiento con **Korlym**, es posible que se necesite ajustar mis medicamentos para la diabetes o para la presión arterial alta

Es importante que tu equipo de profesionales de atención médica esté atento a los cambios y efectos secundarios que pueden ocurrir durante el tratamiento con Korlym.

- **Nivel bajo de potasio (hipocalcemia)**

Se puede presentar nivel bajo de potasio en cualquier momento durante el tratamiento con **Korlym**. Los síntomas de niveles bajos de potasio incluyen debilidad muscular, dolores, calambres, latidos cardíacos anormales o irregulares (palpitaciones), estreñimiento e hinchazón de las manos o los pies (edema).

- **Abstinencia de cortisol**

La baja actividad del cortisol puede provocar efectos de abstinencia de cortisol, como fatiga (sensación de mucho cansancio), dolor o debilidad muscular o articular, náuseas y dolor abdominal. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**. Estos síntomas pueden mejorar a medida que se alcance la dosis adecuada de **Korlym** para tu cuerpo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir: (continuación)

- **sangrado vaginal.** Korlym puede hacer que el revestimiento de su útero se engrose y que su útero sangre. Informe de inmediato a su médico sobre cualquier sangrado vaginal que no sea normal para usted
- **alteraciones en el ciclo menstrual**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante sobre Korlym](#).

Korlym
mifepristone
300 mg Tablets

Cómo me puede afectar Korlym (continuación)

- **Cambios en el nivel de azúcar en la sangre**

Se ha demostrado que **Korlym** reduce los niveles de azúcar en la sangre en 6 semanas.* Es posible que sea necesario reducir o suspender los medicamentos para la diabetes, incluida la insulina.

- **Cambios en la presión arterial**

Es posible que sea necesario aumentar o disminuir los medicamentos para la presión arterial.

- **Hinchazón de manos y pies (edema)**

Durante el tratamiento con **Korlym**, puede producirse hinchazón de manos y pies. Si esto sucede junto con un aumento de la presión arterial, puede ser un signo de bajo nivel de potasio.

- **Sangrado vaginal**

Si tienes útero y estás tomando **Korlym**, es posible que tengas sangrado vaginal inusual, como manchado, saltarse las menstruaciones, menstruaciones irregulares u otros cambios menstruales. Si notas signos de sangrado inusual, informa a tu equipo de profesionales de atención médica de inmediato. También se recomienda que le informes a tu ginecólogo que estás tomando **Korlym**. Las pacientes no deben usar anticonceptivos hormonales mientras toman **Korlym**.

- **Cambios en el ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT)**

Korlym no debe usarse con ciertos medicamentos o en pacientes con ciertas afecciones que provoquen cambios en el ritmo cardíaco (intervalo QT prolongado). Si es necesario el tratamiento, siempre se debe usar la dosis efectiva más baja.

- **Afecciones tratadas con corticosteroides**

Korlym no debe ser utilizado por pacientes que estén en terapia con corticosteroides con el fin de salvar su vida.

* En pacientes adultos con hipercortisolismo (síndrome de Cushing endógeno) que tenían diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir: (continuación)

- problemas con el sistema eléctrico del corazón (prolongación del intervalo QT)
- empeoramiento de los síntomas de otros problemas médicos que se tratan con corticoesteroides cuando toma corticoesteroides y Korlym al mismo tiempo

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym
mifepristone
300 mg Tablets

Información importante para profesionales de atención médica

Imprime esta página, completa tu información y llévasela a tu equipo de profesionales de atención médica. Vuelve a imprimir esta página cada vez que necesites tarjetas adicionales.



Si tiene preguntas sobre el tratamiento de su paciente, llame al médico que le prescribió.

Nombre del paciente: _____

Nombre del médico que prescribe: _____

Teléfono: _____

Si **receta por primera vez o cambia** algún medicamento para este paciente, **llame o envíe por fax la lista de medicamentos del paciente** al farmacéutico especializado para que se verifiquen las interacciones.

Comuníquese con la farmacia especializada
Teléfono: 1-855-4KORLYM (1-855-456-7596)
Fax: 1-855-288-0601

Los profesionales de atención médica pueden reportar inquietudes de seguridad las 24 horas a la **Línea Directa de Atención Médica de Corcept**
1-855-844-3270

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym? (continuación)

Los efectos secundarios más comunes de Korlym incluyen náuseas, fatiga, dolor de cabeza, bajo nivel de potasio en sangre, dolor en brazos y piernas (artralgia), vómitos, hinchazón de brazos y piernas (edema periférico), presión arterial alta, mareos, disminución del apetito, y engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico. Le recomendamos reportar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym.

Korlym®
mifepristone
300 mg Tablets

INDICACIÓN

Korlym es un medicamento recetado que se usa para tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) causado por niveles altos de cortisol en la sangre (hipercortisolismo) en adultos con síndrome de Cushing endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa y que no pueden someterse a cirugía o para quienes la cirugía ha fallado.

Korlym no es para personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no causada por el síndrome de Cushing.

Se desconoce si **Korlym** es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Korlym?

Korlym puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Pérdida del embarazo.** Si es mujer y puede quedar embarazada, usted debe:
 - tener un resultado negativo en la prueba de embarazo antes de empezar a tomar **Korlym** o antes de reiniciar el tratamiento con **Korlym** si deja de tomarlo durante más de 14 días
 - usar un método anticonceptivo no hormonal mientras toma **Korlym** y durante un mes después de dejar de tomar **Korlym**. Hable con su médico sobre cómo prevenir el embarazo. Informe de inmediato a su médico si cree que puede estar embarazada

No tome Korlym si:

- está embarazada
- está tomando medicamentos que contienen simvastatina, lovastatina, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, pimozida, quinidina, sirolimus o tacrolimus
- debe tomar medicamentos corticoesteroides para otros problemas médicos graves
- ha experimentado sangrado vaginal inexplicable, cambios en las células que recubren su útero (hiperplasia endometrial) o cáncer del recubrimiento de su útero (cáncer endometrial)
- tiene alergia a la mifepristona o a cualquiera de los ingredientes de **Korlym**

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Korlym?

Los efectos secundarios graves de Korlym también pueden incluir:

- **reducción de los efectos de las hormonas suprarrenales (insuficiencia suprarrenal).** Informe de inmediato a su médico si presenta cansancio o debilidad inusuales, náuseas, fatiga, presión arterial baja (hipotensión), nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)
- **bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia).** Su médico debe revisar el nivel de potasio en su sangre antes de que usted empiece a tomar **Korlym** y mientras

lo toma. Informe a su médico si tiene debilidad muscular, dolores o calambres, latidos anormales o irregulares del corazón (palpitaciones)

- **sangrado vaginal.** **Korlym** puede hacer que el revestimiento de su útero se engrose y que su útero sangre. Informe de inmediato a su médico sobre cualquier sangrado vaginal que no sea normal para usted
- **alteraciones en el ciclo menstrual**
- **problemas con el sistema eléctrico del corazón (prolongación del intervalo QT)**
- **empeoramiento de los síntomas de otros problemas médicos que se tratan con corticoesteroides cuando toma corticoesteroides y Korlym al mismo tiempo**

Los efectos secundarios más comunes de Korlym incluyen náuseas, fatiga,

dolor de cabeza, bajo nivel de potasio en sangre, dolor en brazos y piernas (artralgia), vómitos, hinchazón de brazos y piernas (edema periférico), presión arterial alta, mareos, disminución del apetito, y engrosamiento del revestimiento del útero (hipertrofia endometrial).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **Korlym**. Para consejo médico sobre efectos secundarios, llame a su médico. Le recomendamos reportar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Antes de tomar Korlym, informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada, si tiene bajo nivel de potasio en sangre (hipocalcemia), si tiene o ha tenido un problema de hemorragia o si está tomando medicamentos para diluir la sangre, si tiene o ha tenido problemas cardíacos, si se ha sometido a un trasplante de órganos, si ha estado tomando medicamentos llamados corticoesteroides (cortisona, dexametasona, metilprednisolona, prednisolona, prednisona), si está amamantando o planea amamantar.

No debe beber jugo de toronja (pomelo) mientras toma **Korlym**.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de **Korlym** con ciertos medicamentos puede provocar que se afecten entre sí o causar efectos secundarios graves.

Consulte la **Información Importante** sobre **Korlym**, con una advertencia importante.



Obtén apoyo individual durante todo tu tratamiento

Los **Promotores del Paciente Corcept Cares** están disponibles para brindar apoyo personalizado durante todo el tratamiento. Pueden ofrecer información y recursos educativos sobre:

- Hiperkortisolismo
- Cómo funciona **Korlym**
- Por qué es importante el monitoreo
- Qué se puede esperar durante el tratamiento

*Aunque los **Promotores del Paciente** brindan apoyo personalizado, no pueden ofrecer consejo médico. Habla regularmente con tu profesional de atención médica sobre tu tratamiento y cualquier efecto secundario que puedas presentar.*



**Comunícate con un Promotor
del Paciente; para ello,
escanea el código QR,
visita Korlym.com o llama
al 1-855-295-9969.**

Consulte la Información Importante de Seguridad a lo largo de este documento y la [Información Importante](#) sobre Korlym, incluyendo una advertencia importante sobre la pérdida de embarazos.